

CÂNCER DE VULVA

Pré-Requisitos:

- Biópsia comprovando diagnóstico da neoplasia em questão.
- Exames de imagem com comprovação de estadiamento.

1. TRATAMENTO NEOADJUVANTE OU TRATAMENTO CURATIVO - DOENÇA LOCALMENTE AVANÇADA OU PACIENTES INOPERÁVEIS

Estádios clínicos III e IVA.

Tabela 1

Código	Regime	Dose e esquema	Frequência
99105010 99105011 99105012 99105013 99116010 99116011	Cisplatina / 5-Fluorouracil	Cisplatina 50mg/m ² no D1+ 5- Fluorouracil 1000mg/m ² de D1 a D4	Concomitantemente com D1 e D22 da radioterapia
99105010 99105011 99105012 99105013	Cisplatina	40 mg/m ² semanal	concomitante a RT
99124010 99116010 99116011	Mitomicina-C / 5- Fluorouracil	Mitomicina-C 10mg/m ² no D1 5- Fluorouracil 800mg/m ² de D1 a D4	Concomitantemente a radioterapia

2. TRATAMENTO PALIATIVO

Estádio IVB.

Tabela 2

Código	Regime	Dose e esquema	Frequência
99105010 99105011 99105012 99105013 99116010 99116011	Cisplatina / 5-Fluorouracil	Cisplatina 50mg/m ² no D1+ 5- Fluorouracil 1000mg/m ² de D1 a D4	Cada 28 dias
99124010 99116010 99116011	Mitomicina-C / 5- Fluorouracil	Mitomicina-C 10mg/m ² no D1 5- Fluorouracil 800mg/m ² de D1 a D4	Cada 28 dias

Recorrência local em área não-irradiada.

Tabela 3

Código	Regime	Dose e esquema	Frequência
99124010 99116010 99116011	Mitomicina-C / 5-Fluoruracil	Mitomicina-C 15mg/m ² no D1 5- Fluorouracil 750mg/m ² de D1 a D5	Concomitantemente com D1 e D42 da radioterapia

Observação: a Cisplatina poderá ser substituída pela Carboplatina em pacientes com contra-indicações ao uso da Cisplatina: idosos acima de 70 anos, insuficiência renal ou cardiopatia.

Profissionais Solicitantes:

- Médico.