

NIVOLUMABE

CÓDIGO	DESCRIPTOR
99146752	NIVOLUMABE FA- POR MG

Indicação:

- Melanoma

Em monoterapia para o tratamento de melanoma avançado (irressecável ou metastático).

No tratamento adjuvante em adultos com melanoma com envolvimento de linfonodos ou doença metastática completamente ressecada.

- Câncer de Pulmão de Células Não Pequenas

No tratamento de câncer de pulmão de células não pequenas (CPCNP) localmente avançado ou metastático com progressão após quimioterapia à base de platina.

Pacientes com mutação EGFR ou ALK devem ter progredido após tratamento com antiEGFR e anti-ALK antes de receber nivolumabe.

- Carcinoma de Células Renais Avançado

É indicado para o tratamento de carcinoma de células renais (CCR) metastático em segunda linha de tratamento.

- Linfoma de Hodgkin Clássico

Para o tratamento de pacientes com Linfoma de Hodgkin clássico (LHc) em recidiva ou refratário após transplante autólogo de células-tronco (TACT) seguido de tratamento com brentuximabe vedotina.

- Carcinoma de Células Escamosas de Cabeça e Pescoço

É indicado para o tratamento de pacientes com carcinoma de células escamosas de cabeça e pescoço (CCECP) recorrente ou metastático, com progressão da doença durante ou após terapia à base de platina.

- Carcinoma Urotelial

É indicado para o tratamento de pacientes com carcinoma urotelial (CU) localmente avançado irressecável ou metastático após terapia prévia à base de platina.

É indicado para o tratamento adjuvante de pacientes com carcinoma urotelial músculo-invasivo (CUMI) que apresentam alto risco de recorrência após serem submetidos à ressecção radical do tumor.

- Carcinoma de Células Escamosas do Esôfago

É indicado para o tratamento de carcinoma de células escamosas do esôfago (CCEE) irressecável avançado ou metastático após quimioterapia prévia à base de fluoropirimidina e platina.

- Tratamento adjuvante de câncer esofágico ou de câncer da junção gastroesofágica, completamente ressecados

Para o tratamento adjuvante do câncer esofágico (CE) ou câncer da junção gastroesofágica (CJEG), completamente ressecados, em pacientes que apresentem doença patológica residual após tratamento com quimiorradioterapia (QRT) neoadjuvante.

- Câncer gástrico, câncer da junção gastroesofágica e adenocarcinoma esofágico

Em combinação com quimioterapia contendo fluoropirimidina e platina, é indicado para o tratamento de pacientes com câncer gástrico (CG), câncer da junção gastroesofágica (CJEG) e adenocarcinoma esofágico (ACE), avançado ou metastático.

Pré-Requisitos:

- Biópsia comprovando diagnóstico da neoplasia em questão.
- Exames de imagem com comprovação de estadiamento.

Profissionais Solicitantes:

- Médicos.