

## ANGIOPLASTIA DE ARTÉRIA CARÓTIDA

TABELA	CÓDIGO IPSEMG	PROCEDIMENTO
HOSPITALAR	40813070	ANGIOPLASTIA DE TRONCO SUPRA-AORTICO
HOSPITALAR	40813207	COLOCACAO DE STENT EM TRONCO SUPRA-AORTICO

### Foco:

- Médicos reguladores e auditores.
- Revisão regras de negócio do SAFe.

### Indicação:

A cirurgia é o padrão ouro para o tratamento da estenose da artéria carótida.

A angioplastia com stent é considerada em pacientes com sintomas neurológicos hemisféricos recentes (últimos 06 meses), com estenose superior a 70% (critério básico), e pelo menos um dos seguintes critérios adicionais:

- Oclusão de artéria carótida contralateral.
- Irradiação terapêutica cervical prévia ou procedimento cirúrgico cervical prévio extenso (p.ex., linfadenectomias e ressecções tumorais).
- Lesão cervical alta, C2 ou superior.
- Lesão infraclavicular.
- Paralisia de nervo laríngeo recorrente contralateral.
- Reestenose carotidiana.
- Traqueostomia.
- Insuficiência cardíaca congestiva classe funcional NYHA III ou IV.
- Angina instável.
- Lesão de tronco de artéria coronária esquerda ou lesão igual ou superior a 70% de pelo menos 2 artérias coronárias principais.
- Infarto agudo do miocárdio nos últimos 30 dias.
- Insuficiência renal crônica grave (clearance de creatinina < 15%).
- Fração de ejeção ventricular inferior a 30%.
- Previsão de cirurgia cardíaca nos próximos 30 dias.
- Doença pulmonar crônica grave.

### Contraindicação:

- Pacientes assintomáticos.
- As mesmas contra-indicações relativas ou absolutas associadas à utilização de contraste iodado.

### Pré-Requisitos:

- Solicitação médica constando o quadro clínico detalhado, presença de sintomas hemisféricos se houver, tratamento clínico realizado, medicamentos, dose, tempo de uso, etc.
- Laudos dos exames comprobatórios da doença carotídea que comprovem o critério básico e algum dos critérios adicionais.

### Profissionais Solicitantes (preferencial):

- Médicos angiologistas.
- Neurologistas.
- Cardiologistas.
- Hemodinamicistas.

**Prioridades:**

Isquemia cerebral transitória até 15 dias após o início dos sintomas.

06/02/2018