

### CANCER CANAL ANAL

CÓDIGO IPSEMG	PROCEDIMENTO	INDICAÇÕES DO TRATAMENTO
99124010 99116010 99116011	Mitomicina 10 mg/m <sup>2</sup> no D1 Fluorouracil 1000 mg/m <sup>2</sup> (infusão contínua) de D1 a D4	Tratamento Curativo: Doença localizada (M0)* (Radioterapia + Quimioterapia)
99105010 99105011 99105012 99116010 99116011	Cisplatina** 75 mg/m <sup>2</sup> no D1 Fluorouracil 1000 mg/m <sup>2</sup> (infusão contínua) de D1 a D4	Tratamento Curativo: Doença localizada (M0)* (Radioterapia + Quimioterapia) OU Tratamento Paliativo: Doença Disseminada (M1)

#### Foco:

- Médicos reguladores e auditores.
- Revisão regras de negócio do SAFe.

#### Indicação:

- Quimioterapia CURATIVA, em cancer de canal anal estadio M0
- Quimioterapia paliativa, em cancer de canal anal estadio IV (presença de metástase)
- O Sistema de Regulação do IPSEMG fará o controle dos esquemas terapêuticos quanto a combinação dos quimioterápicos, dose terapêutica individualizada, periodicidade e duração do tratamento, promovendo revisão e ajustes periódicos.
- O número de ciclos executados no período de 1 ano deverá ser aplicado ao somatório de neoadjuvância e adjuvância.

#### Pré-Requisitos

- Laudo anatomo-patológico
- Superfície corporal
- Relatório médico do estadio clínico
- Exames de estadiamento
- Relatório médico da radioterapia concomitante
- Categoria do tratamento: Curativo ou Paliativo

#### Profissionais Solicitantes (*Preferencial*):

- Oncologistas

#### Prioridades:

Cancer canal anal M0

\* Estadio clínico: TNM (*AJCC Cancer Staging Manual, Seventh Edition (2010)*)

\*\* A Cisplatina poderá ser substituída pela Carboplatina (Código IPSEMG 99103010; 99103011; 99103012) em pacientes com contra-indicações ao seu uso: idosos acima de 70 anos, portadores de insuficiência renal ou cardiopatia.