

## CÂNCER DE PÊNIS

CÓDIGO IPSEMG	PROCEDIMENTO	INDICAÇÕES DO TRATAMENTO
99105010 99105011 99105012 99116010 99116011	Cisplatina** 100mg/m <sup>2</sup> no D1+ 5-Fluoruracil 1000mg/m <sup>2</sup> de D1 a D4	Tratamento Neoadjuvante; e Adjuvante para Estadio III, e estadio IV Paliativo - quimioterapia seguida de cirurgia ou radioterapia
99127010 99127011 99127012 99105010 99105011 99105012 99139010 99139011	Paclitaxel, 175 mg/m <sup>2</sup> EV, D1 + Cisplatina, 25 mg/m <sup>2</sup> EV, D1 a D3, + Ifosfamida, 1.200 mg/m <sup>2</sup> EV, D1 a D3,+ Mesna, 400 mg/m <sup>2</sup> EV, (pré e pós Ifosfamida)	Tratamento Paliativo Estadio IV

### Foco:

- Médicos reguladores e auditores.
- Revisão regras de negócio do SAFe.

### Indicação:

- Quimioterapia neoadjuvante em cancer de pênis, T4pN3, para obtenção de condições para cirurgia ou radioterapia.
- Quimioterapia adjuvante e paliativa em cancer de pênis.
- O Sistema de Regulação do IPSEMG fará o controle dos esquemas terapêuticos quanto a combinação dos quimioterápicos, dose terapêutica individualizada, periodicidade e duração do tratamento, promovendo revisão e ajustes periódicos.
- O número de ciclos executados no período de 1 ano deverá ser aplicado ao somatório de neoadjuvância e adjuvância.

### Pré-Requisitos

- Laudo anatomo-patológico
- Superfície corporal
- Relatório médico do estadio clínico
- Exames de estadiamento
- Relatório médico da cirurgia ou radioterapia proposta
- Categoria do tratamento: Neoadjuvancia e Adjuvancia ou Paliativo

### Profissionais Solicitantes (*Preferencial*):

- Oncologistas

### Prioridades:

Cancer de pênis com ausência de envolvimento nodal (pN0)

\* Estadio clínico: TNM (*AJCC Cancer Staging Manual, Seventh Edition (2010)*)

\*\* A Cisplatina poderá ser substituída pela Carboplatina (Código IPSEMG 99103010; 99103011;99103012) em pacientes com contra-indicações ao seu uso: idosos acima de 70 anos, portadores de insuficiência renal ou cardiopatia.