

CANCER ESTOMAGO E JUNÇÃO ESOFAGO-GÁSTRICA

CÓDIGO IPSEMG	PROCEDIMENTO	INDICAÇÕES DO TRATAMENTO
99116010 99116011 99101010 99101011	Fluorouracil 425mg/m ² de D1 a D5 (OU D3)+ Ácido folínico 20mg/m ² de D1a D5(OU D3)	Tratamento adjuvante: Estádios clínicos IB a IVA nas 1 ^a ; 2 ^a e 3 ^a FASES
99105010 99105011 99105012 99116010 99116011	Cisplatina** 75 mg/m ² no D1 Fluorouracil 1000 mg/m ² (BIC) de D1 a D4	Tratamento exclusivo com quimioterapia e Neoadjuvância
99105010 99105011 99105012 99116010 99116011 99112110 99112011	Cisplatina** 60 mg/m ² no D1 Fluorouracil 200 mg/m ² por 21 dias (infusão contínua) Epirrubicina 50 mg/m ² no D1	
99105010 99105011 99105012 99116010 99116011 99140010	Cisplatina** 75 mg/m ² D1 + Fluorouracil 1000 mg/m ² D1 a D5 a cada 21 dias + Trastuzumabe 8 mg/kg (dose ataque), seguido por 6 mg/kg, a cada 21 dias.	Pacientes com hiperexpressão de HER2 (ver indicações)***
99110010 99110011 99105010 99105011 99105012 99116010 99116011	Docetaxel 75 mg/m ² EV + Cisplatina 75 mg/m ² EV, ambos no D1, + 5-FU, 750 mg/m ² EV IC, D1 a D5,	Tratamento paliativo para pacientes com bom estado geral, sem comorbidades.
99105010 99105011 99105012 99116010 99116011	Cisplatina** 100 mg/m ² no D1 Fluorouracil 1000 mg/m ² (infusão contínua) de D1 a D4	Tratamento paliativo: Primeira linha (Pacientes em estadio M1 ou doença irressecável) ou segunda linha em esquema previamente não utilizado
99113010 99116010 99116011 99101010 99101011	Etoposideo 120 mg/m ² no D1-D3 Fluorouracil 500 mg/m ² D1-D3 Ácido folínico 300 mg/m ² de D1a D3	
99105010 99105011 99105012 99116010 99116011 99112110 99112011	Cisplatina** 60 mg/m ² no D1 Fluorouracil 200 mg/m ² por 21 dias (infusão contínua) Epirrubicina 50 mg/m ² no D1	
99105010 99105011 99105012 99122010 99122011	Cisplatina** 30 mg/m ² no D1 , D8 e D15 Irinotecano 65mg/m ² nos D1, D8 e D15	
99127010 99127011 99127012	Paclitaxel 135-175 mg/m ²	
99110010 99110011	Docetaxel 60 mg/m ²	
99122010 99122011	Irinotecano 150 mg/m ² de 14/14 dias .	

Foco:

- Médicos reguladores e auditores.
- Revisão regras de negócio do SAFe.

Indicação:

- Quimioterapia neoadjuvante, adjuvante e paliativa, em cancer de estomago
- ***Ca de estômago com **HER2 positivo 3(+)** e/ou teste de **FISH positivo**.
- O Sistema de Regulação do IPSEMG fará o controle dos esquemas terapêuticos quanto a combinação dos quimioterápicos, dose terapêutica individualizada, periodicidade e duração do tratamento, promovendo revisão e ajustes periódicos.
- O número de ciclos executados no período de 1 ano deverá ser aplicado ao somatório de neoadjuvância e adjuvância.

Contraindicação:

- ***O uso do TRASTUZUMABE está contraindicado nas seguintes condições:
- HER2 0(zero) ou 1(+)
- HER2 2(+) com FISH negativo.
- Insuficiência cardíaca grau funcional (NYHA) >3

Pré-Requisitos:

- Laudo anatomo-patológico
- Superfície corporal
- Relatório médico do estadio clínico
- Exames de estadiamento
- Categoria do tratamento: Neoadjuvancia e Adjuvancia ou Paliativo
- ***Pesquisa de HER 2 positiva, com status confirmado por exame molecular (FISH ou CISH), quando indicado.

Profissionais Solicitantes (Preferencial):

- Oncologistas

Prioridades:

Cancer estômago estadio IB a IVA

* Estadio clínico: TNM (*AJCC Cancer Staging Manual, Seventh Edition (2010)*)

** A Cisplatina poderá ser substituída pela Carboplatina (Código IPSEMG 99103010; 99103011;99103012) em pacientes com contra-indicações ao seu uso: idosos acima de 70 anos, portadores de insuficiência renal ou cardiopatia.