

ANEXO LXI

CARCINOMA ANAPLÁSICO DE TIREÓIDE

CÓDIGO IPSEMG	PROCEDIMENTO	INDICAÇÕES DO TRATAMENTO
99111010 99111011	Doxorrubicina 25 mg/m ² , semanal junto à RT**	Estádios IVa e IVb.
99127010 99127011 99127012	Paclitaxel 90 mg/m ² , semanal junto à RT**	Estádios IVa e IVb

Foco:

- a) Médicos reguladores e auditores.
- b) Revisão regras de negócio do SAFe.

Indicação:

- a) Quimioterapia paliativa, considerado como estadio 4 (o carcinoma anaplásico será considerado estadio IV)
- b) O Sistema de Regulação do IPSEMG fará, sob revisão e ajustes periódicos, o controle dos esquemas terapêuticos quanto a combinação dos quimioterápicos, dose terapêutica individualizada, periodicidade e duração do tratamento.

Pré-Requisitos:

- a) Laudo anatomo-patológico
- b) Exames de estadiamento
- c) Superfície corporal

Profissionais Solicitantes (Preferencial):

- a) Oncologistas

* Estadio clínico: TNM (AJCC Cancer Staging Manual, Seventh Edition (2010))

**Radioterapia (RT) concomitante