

CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSIONAL DE REPOUSO E ESTRESSE COM TÉCNICA TOMOGRÁFICA PARA DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO DE DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA (DAC)

TABELA	CÓDIGO IPSEMG	PROCEDIMENTO
AMBULATORIAL/ HOSPITALAR	40701068	CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO PERFUSAO - REPOUSO E ESTRESSE (INCLUI TESTE ERGOMETRICO/ESTRESSE FARMACOLOGICO)

Foco:

- Médicos reguladores e auditores.
- Revisão regras de negócio do SAFe.

Indicação:

- Impossibilidade técnica e ou indisponibilidade para a realização ecocardiografia de estresse.
- Diagnóstico de DAC em pacientes com contra-indicação ao Teste Ergométrico Computadorizado (WPW; Infra de ST>1mm no ECG de repouso; Bloqueio de Ramo Esquerdo (BCRE) ou direito com alterações do segmento ST - T; e paciente em uso de digoxina).
- Impossibilidade para realização de teste de esforço, limitação ortopédica ou neurológica.
- Teste ergométrico positivo, ineficaz ou limitrófe para isquemia miocárdica.
- Probabilidade clínica pré-teste maior que 50% (moderada/alta).

Contraindicação:

Absolutas:

- Síndrome coronariana aguda.

Relativas:

- Dobutamina: Hipertensão arterial descontrolada.
- Dipyridamol: Uso de teofilina e cafeína até 05 dias antes do exame.

Pré-Requisitos:

- História Clínica.
- Exame Físico.
- ECG de repouso.

Profissionais Solicitantes (preferencial):

- Cardiologistas.
- Cirurgiões cardiovasculares.
- Angiologistas.

Prioridades:

- Probabilidade para doença coronariana (pré-teste) maior que 70%.