

ANEXO LXV

LINFOEPITELIOMA

CÓDIGO IPSEMG	PROCEDIMENTO	INDICAÇÕES DO TRATAMENTO
99105010 99105011 99105012	Cisplatina** 100/mg ² D1, D22 e D43	Tratamento curativo combinado à radioterapia
99105010 99105011 99105012	Cisplatina 30/mg ² semanal	Tratamento curativo combinado à radioterapia
99116010 99116011 99105010 99105011 99105012	5-Fluoruracil 1000mg/m ² de D1 a D4 Cisplatina 80/mg ²	Após 2 a 3 semanas da radioterapia, iniciar quimioterapia adjuvante
99102010 99112010 99112011 99105010 99105011 99105012	Bleomicina 15mg D1 Epirrubicina 500mg/m ² D1 Cisplatina 60/mg ² D1	
99102010 99116010 99116011 99105010 99105011 99105012	Bleomicina 30mg nos D1, D8 e D15 5- Fluoruracila 650 mg/m ² no D1 Cisplatina 20mg/m ² D1 a D5	
99127010 99127011 99127012	Paclitaxel 80/mg ² semanal	

Foco:

- a) Médicos reguladores e auditores.
- b) Revisão regras de negócio do SAFe.

Indicação:

- a) Tratamento curativo, combinado à radioterapia.

b) Tratamento paliativo de primeira linha: usar uma das combinações acima que não tenha sido usada anteriormente.

c) O Sistema de Regulação do IPSEMG fará, sob revisão e ajustes periódicos, o controle dos esquemas terapêuticos quanto a combinação dos quimioterápicos, dose terapêutica individualizada, periodicidade e duração do tratamento.

Pré-Requisitos:

- a) Laudo anatomo-patológico
- b) Exames de estadiamento
- c) Superfície corporal

Profissionais Solicitantes (*Preferencial*):

- a) Oncologistas

* Estadio clínico: TNM (AJCC Cancer Staging Manual, Seventh Edition (2010))

** A Cisplatina poderá ser substituída pela Carboplatina, (Código IPSEMG 99103010; 99103011;99103012) em pacientes com contra-indicações ao seu uso: idosos acima de 70 anos, portadores de insuficiência renal ou cardiopatia al ou cardiopatia