

RADIOGRAFIA DO ESÔFAGO, ESTÔMAGO E DUODENO (REED)

Descrição:

O REED (Radiografia do Esôfago, Estômago e Duodeno) é um exame que utiliza raios X (radiação ionizante) para obtenção de imagens desses órgãos.

O paciente ingere um contraste radiológico (baritado, ou mais raramente iodado) para realização de radiografias em diversas posições. Muitas vezes, é necessário ingerir também sal efervescente.

Indicações:

Avaliação morfológica e funcional do esôfago, estômago e duodeno.

Contraindicações:

Mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez.

Peso superior a 90 kg (para o equipamento do hospital).

Efeitos adversos:

Quando tomadas as devidas precauções, os riscos são baixos e se relacionam principalmente aos efeitos gerais da radiação ionizante sobre o organismo*.

Apesar de muito rara, existe também a possibilidade de ocorrerem reações adversas relacionadas ao preparo ou ao contraste.

() O efeito da radiação no organismo pode ser comparado ao de um remédio. Em pequenas doses, é benéfico, pois ajuda no diagnóstico e no acompanhamento do tratamento. Em altas doses, entretanto, pode ser perigoso à saúde.*

Os efeitos colaterais da radiação usada em exames radiológicos são muito raros. Os médicos e técnicos em radiologia são treinados para usar a menor quantidade de radiação necessária para obter os resultados desejados.

É sempre recomendável que se utilize também proteção de chumbo, de forma a minimizar a dose recebida, desde que a mesma não interfira com o objetivo do exame.

Duração do exame:

Aproximadamente 30 minutos, sujeita a variações.

O paciente poderá permanecer em observação no hospital por alguns minutos após o exame.

Agendamento:

Telefone 155.

Este exame é realizado no turno da manhã.

ORIENTAÇÕES PARA O EXAME:

Adultos:

Na véspera, fazer alimentação mais leve, à base de sopas e líquidos. Não ingerir os seguintes alimentos: gorduras, bebidas gasosas, leite e derivados, feijão, repolho, cebola, couve, couve-flor, brócolis, lentilha e grão-de-bico.

Evitar o fumo.

Jejum absoluto de 12 horas, **inclusive de água**.

Trazer 1 envelope de Sal de Fruta ENO^R (ou similar).

Crianças abaixo de 2 anos:

Suspender a última refeição (ou mamada) antes do exame, ou seguir recomendação do pediatra.

Crianças acima de 2 anos:

Jejum de 6 horas, inclusive de água, ou seguir recomendação do pediatra.

*** CRIANÇAS QUE SE ALIMENTAM DE LEITE MATERNO: TRAZER 1 MAMADEIRA VAZIA.**

*** CRIANÇAS EM USO DE MAMADEIRA: TRAZER 1 MAMADEIRA VAZIA + 1 MAMADEIRA COM O ALIMENTO DE COSTUME.**

Obs.: o bico da mamadeira poderá ficar inutilizável após o exame.

OBSERVAÇÕES:

- * Paciente diabético em uso de insulina ou hipoglicemiante oral deverá comunicar ao seu médico para ajuste das doses em relação ao jejum.
- * Não suspender os medicamentos de uso regular. Tomá-los com a menor quantidade de água possível, de preferência 4 horas antes do exame.
- * Este exame não é realizado em gestantes.
- * Trazer exames anteriores, como raios X, endoscopia, ultrassom, tomografia, biopsia etc.
- * Usar roupas sem zíper, metais ou pedrarias.

- * Sem exceções, o exame só poderá ser realizado com a apresentação do pedido médico original, emitido há menos de 6 meses, sem rasuras, contendo:
 - nome completo do paciente;
 - nome do exame e/ou código corretos;
 - justificativa do exame / diagnóstico (informação médica);
 - data da solicitação;
 - carimbo com CRM e assinatura do médico.
- * Chegar 20 minutos antes do horário marcado para solicitar a autorização do exame no guichê do Serviço de Radiologia.
- * Existirá tolerância de no máximo 15 minutos em caso de eventual atraso na chegada.
- * Em caso de desistência, gentileza informar-nos com a maior antecedência possível através do telefone 155. Outra paciente poderá ser beneficiada com essa vaga.
- * Havendo dúvidas, entrar em contato conosco pessoalmente ou através do telefone abaixo. Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, de 7 a 18 horas.

Após o exame:

- Tomar bastante líquido.
- Havendo prisão de ventre, consulte imediatamente seu médico para avaliar possibilidade de uso de laxante, a fim de garantir a eliminação total do contraste usado no exame.
- Em caso de mal estar ou reações anormais, procurar atendimento médico de urgência.

Local do exame:

HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO – Alameda Ezequiel Dias, 225 – 2º andar (Serviço de Radiologia e Diagnóstico por Imagem) – Belo Horizonte.
Telefones: (31) 3237-2140 / 3237-2575.