

# TRÂNSITO OU MORFOLGIA DO DELGADO TRÂNSITO INTESTINAL

### Descrição:

O trânsito intestinal é um exame que utiliza raios X para obtenção de imagens do intestino delgado.

O paciente ingere um contraste radiológico (baritado, ou mais raramente iodado) para realização de radiografias em diversas posições e horários.

### Indicações:

Avaliação morfológica e funcional do intestino delgado.

### Contraindicações:

Mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez.

Peso superior a 90 kg (para o equipamento do hospital).

### **Efeitos adversos:**

Quando tomadas as devidas precauções, os riscos são baixos e se relacionam principalmente aos efeitos gerais da radiação ionizante sobre o organismo\*.

Apesar de muito rara, existe também a possibilidade de ocorrerem reações adversas relacionadas ao preparo ou ao contraste.

(\*) O efeito da radiação no organismo pode ser comparado ao de um remédio. Em pequenas doses, é benéfico, pois ajuda no diagnóstico e no acompanhamento do tratamento. Em altas doses, entretanto, pode ser perigoso à saúde.

Os efeitos colaterais da radiação usada em exames radiológicos são muito raros. Os médicos e técnicos em radiologia são treinados para usar a menor quantidade de radiação necessária para obter os resultados desejados.

É sempre recomendável que se utilize também proteção de chumbo, de forma a minimizar a dose recebida, desde que a mesma não interfira com o objetivo do exame.

### Duração do exame:

Várias horas.

# Agendamento:

Telefone 155.

# **ORIENTAÇÕES PARA O EXAME:**

### **ADULTOS:**

Jejum de 12 horas.

## **CRIANÇAS ABAIXO DE 2 ANOS:**

Suspender a última refeição (ou mamada) antes do exame, ou seguir recomendação do pediatra.

### **CRIANÇAS ACIMA DE 2 ANOS:**

Jejum de 6 horas, ou seguir recomendação do pediatra.

- \*\* CRIANÇAS QUE SE ALIMENTAM DE LEITE MATERNO: TRAZER 1 MAMADEIRA VAZIA. \*\*
- \*\* CRIANÇAS EM USO DE MAMADEIRA: TRAZER 1 MAMADEIRA VAZIA + 1 MAMADEIRA COM O ALIMENTO DE COSTUME.\*\*

Obs.: o bico da mamadeira poderá ficar inutilizável após o exame.



# **OBSERVAÇÕES:**

- \* Este exame não é realizado em gestantes.
- \* Paciente diabético em uso de insulina ou hipoglicemiante oral deverá comunicar ao seu médico para ajuste das doses em relação ao jejum.
- \* Não suspender os medicamentos de uso regular. Tomá-los com pouca água, de preferência 4 horas antes do exame.
- \* Trazer exames anteriores, como raios X, endoscopia, ultrassom, tomografia, biopsia etc.
- \* Usar roupas sem zíper, metais ou pedrarias.
- \* O paciente poderá permanecer no hospital durante todo o dia.
- \* <u>Sem exceções</u>, o exame só poderá ser realizado com a apresentação do pedido médico original, emitido há menos de 6 meses, sem rasuras, contendo:
  - nome completo do paciente;
  - nome do exame e/ou código corretos;
  - justificativa do exame / diagnóstico (informação médica);
  - data da solicitação;
  - carimbo com CRM e assinatura do médico.
- \* Chegar 20 minutos antes do horário marcado para solicitar a autorização do exame no guichê do Serviço de Radiologia.
- \* Existirá tolerância de no máximo 15 minutos em caso de eventual atraso na chegada.
- \* Em caso de desistência, gentileza informar-nos com a maior antecedência possível através do telefone 155. Outra paciente poderá ser beneficiada com essa vaga.
- \* Havendo dúvidas, entrar em contato conosco pessoalmente ou através do telefone abaixo. Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, de 7 a 18 horas.

### Após o exame:

- Tomar bastante líquido.
- Havendo prisão de ventre, consulte imediatamente seu médico para avaliar possibilidade de uso de laxante, a fim de garantir a eliminação total do contraste usado no exame.
- Em caso de mal estar ou reações anormais, procurar atendimento médico de urgência.

#### Local do exame:

HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO – Alameda Ezequiel Dias, 225 – 2º andar (Serviço de Radiologia e Diagnóstico por Imagem) – Belo Horizonte. Telefones: (31) 3237-2575 / 3237-2140.